

¿Qué le indican los signos y los síntomas?

ES HORA DE VER EL PANORAMA COMPLETO

Si usted o un ser querido tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y está presentando síntomas que no se resuelven, use esta guía para conversar con un médico sobre la ATTR-CM (cardiomiopatía amiloide por transtirretina).

Síndrome del túnel carpiano

Latido irregular

Insuficiencia cardíaca

Dolor lumbar

Dificultad para respirar

ATTR-CM es una enfermedad rara, diagnosticada menos de lo que ocurre que empeora con el tiempo.

Ayude a su médico a considerar si ATTR-CM puede ser la causa de sus síntomas. Use esta guía para conocer más e iniciar la conversación en su próxima cita.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR


estenosis de la columna lumbar

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLEO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico



Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



FATIGA

cansancio excesivo

La fatiga, en este caso, se debe a la insuficiencia cardiaca (IC).

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO


entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR LUMBAR

estenosis de la columna lumbar

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico



Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

La **amiloidosis** puede depositarse en los tejidos oculares y posiblemente afectar la córnea, la retina o la pupila. Además, puede causar trastornos, como glaucoma.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR


estenosis de la columna lumbar

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLEO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico



Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



RUPTURA DE TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

Las rupturas del tendón de Aquiles y de bíceps no ocurren a causa de un trauma, más bien del debilitamiento muscular debido a la amiloidosis. Este síntoma se encuentra principalmente en personas con ATTR-CM de origen natural.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR



LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca



PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos



DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR

estenosis de la columna lumbar




SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLEO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico



Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



DIFICULTAD PARA RESPIRAR

La dificultad para respirar es uno de los síntomas más comunes de la **ATTR-CM**. Los pacientes sienten que les cuesta trabajo respirar, y se quedan sin aliento con las actividades normales.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR

estenosis de la columna lumbar


SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLEO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico

Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



PROBLEMAS ESTOMACALES
ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

Los problemas estomacales con frecuencia son un síntoma de ATTR-CM y se asocian principalmente con ATTR-CM hereditaria. Estos problemas pueden incluir diarrea, estreñimiento, náusea, sensación de llenura con facilidad o vómitos.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR

estenosis de la columna lumbar

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico

Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

Los latidos anormales, también conocidos como arritmia cardiaca, es un síntoma común de la ATTR-CM, en especial, en personas con ATTR-CM de origen natural.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR


estenosis de la columna lumbar

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLEO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico



Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



DOLOR DE HOMBRO, CADERA Y/O RODILLA

La ATTR-CM puede hacer que las articulaciones se endurezcan, creando dolor en los hombros, las caderas o las rodillas. Esto puede requerir cirugía, como artroplastia o reemplazo de cadera.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR

estenosis de la columna lumbar

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLEO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico

Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO BILATERAL

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

Los pacientes pueden recibir un diagnóstico de síndrome del túnel carpiano bilateral, lo que causa entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos. Aunque puede que parezca no estar relacionado con insuficiencia cardiaca, este es uno de los síntomas más comunes e indicadores tempranos de ATTR-CM, en especial **ATTR-CM natural**.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR


estenosis de la columna lumbar

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico



Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



DOLOR O ENTUMECIMIENTO DE LA ESPALDA BAJA/PIERNAS DEBIDO AL ESTRECHAMIENTO
estenosis de la columna lumbar

Los problemas de la espalda baja y las piernas pueden significar que padece de estenosis de la columna lumbar, que puede ser un signo no cardiaco de ATTR-CM natural.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR


estenosis de la columna lumbar

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico



Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.



SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

Los pacientes con ATTR-CM pueden presentar pérdida sensorial, debilidad muscular y dolor en los dedos de los pies o los pies al igual que problemas del equilibrio.

Si alguno de estos síntomas son familiares, haga clic en el icono(s) para conocer más del porqué estos son importantes para su diagnóstico.

FATIGA

cansancio excesivo

TRASTORNOS OCULARES

eg, glaucoma

RUPTURA DEL TENDÓN

ej., bíceps, tendón de Aquiles

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LATIDOS IRREGULARES

arritmia cardiaca

PROBLEMAS ESTOMACALES

ej., diarrea, estreñimiento, náusea o sensación de llenura con facilidad

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

entumecimiento, cosquilleo o dolor en los dedos de las manos

DOLOR DE HOMBROS, CADERA Y/O RODILLA

DOLOR LUMBAR

estenosis de la columna lumbar

SENSACIÓN DISMINUIDA, COSQUILLO RARO O DOLOR EN LOS DEDOS DE LOS PIES O LOS PIES

neuropatía periférica

HINCHAZÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico

Estos ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Los signos y síntomas pueden variar entre los pacientes.

HINCHAZÓN DE LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS

edema periférico

Muchos pacientes notan hinchazón de la parte inferior de las piernas y los pies, también conocido como edema periférico. Esto puede hacer que las piernas y los pies se vean hinchados e inflamados. La hinchazón de la parte inferior de las piernas (edema periférico) puede ser un síntoma común de ATTR-CM.

LLEVAR CONSTANCIA DE LOS ANTECEDENTES MÉDICOS, EXPEDIENTES Y RESULTADOS DE PRUEBAS

Puede que usted o su ser querido haya visitado a varios médicos buscando entender sus síntomas.

El profesional del cuidado de la salud puede ordenar pruebas adicionales para evaluar el corazón del paciente en busca de signos de ATTR-CM.

Las pruebas clínicas que detectan signos que pueden sugerir ATTR-CM son:



ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

- Lee las señales eléctricas del corazón
- Puede revelar padecimientos como latidos irregulares que pudieran estar relacionados con ATTR-CM

Si se ha hecho pruebas como estas, comparta los resultados con su cardiólogo.

Asegúrese de dejar saber si usted o su ser querido tiene algún dispositivo implantado, cirugías cardíacas pasadas o procedimientos, ya que determinados tipos de pruebas pueden estar contraindicadas.



LLEVAR CONSTANCIA DE LOS ANTECEDENTES MÉDICOS, EXPEDIENTES Y RESULTADOS DE PRUEBAS

Puede que usted o su ser querido haya visitado a varios médicos buscando entender sus síntomas.

El profesional del cuidado de la salud puede ordenar pruebas adicionales para evaluar el corazón del paciente en busca de signos de ATTR-CM.

Las pruebas clínicas que detectan signos que pueden sugerir ATTR-CM son:



ECOCARDIOGRAMA (ECHO)

- Usa ondas sonoras para crear imágenes del corazón
- Los hallazgos asociados con ATTR-CM incluyen insuficiencia cardiaca con una fracción de eyección preservada (HFpEF), que correlaciona la cantidad de sangre que pasa por el corazón con cada latido

Si se ha hecho pruebas como estas, comparta los resultados con su cardiólogo.

Asegúrese de dejar saber si usted o su ser querido tiene algún dispositivo implantado, cirugías cardiacas pasadas o procedimientos, ya que determinados tipos de pruebas pueden estar contraindicadas.

LLEVAR CONSTANCIA DE LOS ANTECEDENTES MÉDICOS, EXPEDIENTES Y RESULTADOS DE PRUEBAS

Puede que usted o su ser querido haya visitado a varios médicos buscando entender sus síntomas.

El profesional del cuidado de la salud puede ordenar pruebas adicionales para evaluar el corazón del paciente en busca de signos de ATTR-CM.

Las pruebas clínicas que detectan signos que pueden sugerir ATTR-CM son:



IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA (MRI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

- Usa radioondas, magnetos y una computadora para crear imágenes del corazón para detectar anomalías

Si se ha hecho pruebas como estas, comparta los resultados con su cardiólogo.

Asegúrese de dejar saber si usted o su ser querido tiene algún dispositivo implantado, cirugías cardíacas pasadas o procedimientos, ya que determinados tipos de pruebas pueden estar contraindicadas.



PREGUNTAS QUE PUEDE CONSIDERAR HACERLE A SU PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LA SALUD

La ATTR-CM puede afectar a cada paciente de manera distinta y las necesidades de su familia, empleo y sociales pueden diferir. Sea abierto en cuanto a sus preguntas o preocupaciones.

Según mis síntomas, antecedentes médicos y antecedentes familiares, ¿cree que la causa de mi insuficiencia cardiaca pudiera deberse a ATTR-CM?

¿Tiene experiencia diagnosticando ATTR-CM o puede recomendarme a un especialista local?

¿Necesito pruebas adicionales para confirmar mi diagnóstico? De ser así, ¿con quién en su oficina debo hablar?

¿Con qué rapidez pudiera progresar esta enfermedad?

Entiendo que esta enfermedad puede afectar distintas partes del cuerpo. ¿Debo buscar a otros especialistas para que formen parte de mi equipo de atención?

¿Hay algún grupo de apoyo o que abogue por el paciente que pueda recomendar que brinde apoyo emocional y mental o información adicional respecto a la ATTR-CM?